

# あぐり

## 最前線



### 土壌分析をしましょう！

#### コスト低減に向けて

J Aでは、肥料の過剰施肥による無駄をなくしコスト低減に繋げるため、土壌分析を毎月実施しています。分析を希望される方は、約1合程度(200g)を採土し、必ず土壌を乾燥させてから袋に入れ、住所氏名・TELと、水稲・野菜(キャベツ、ハクサイ、等・果樹(ミカン、カキ、等)など品目名を記入して、3月12日(金)までに各支店へご持参ください。分析結果は4月中旬頃にご連絡致します。

### 市場出荷休日カレンダー (野菜・果樹)

3月	日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				

4月	日	月	火	水	木	金	土
					1	2	3
	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	

Xは出荷できない日 〇は日曜・祝日等

※防除薬剤のあとの数字は、安全使用基準で、(収穫何日前まで使用可能か/通算使用可能回数)を表しています。農薬は農業安全使用基準を守り、正しく適期に防除してください。

## 水稲



寒づきをしていない水田は、3月末までに必ず耕起するとともに、**土壌改良資材を施用してください。**

### 土壌改良資材の必要性

栽培期間中の高温により、乳白米を中心とした玄米の高温障害が増加し、品質の低下が問題となっています。土壌中のケイ酸や鉄が不足すると地力が低下し、生育後期に稲の生育活性が低下することで、玄米の品質低下につながります。土壌改良資材を施用し、これらの問題を克服しましょう。

### 一発肥料型

・園芸一発S 679 (200kg/10a)

### 病害虫防除

◎石灰欠乏症(アンコ)

春ハクサイでは特に発生しやすいので、適宜灌水で予防しましょう。  
・パフォームCa 500倍  
結球開始期までに葉面散布を2〜3回行ってください。

## ブロッコリー



### 定植

※ピクセル▽3月1日〜10日  
※フォレスト▽3月5日〜15日

### 元肥

・苦土セルカフミン(160kg/10a)

### 元肥・追肥型

・ニューパワーユーキ038プラス(140kg/10a)

### 一発肥料型

・園芸一発S 679 (200kg/10a)

### 病害虫防除

※グラウンドム▽3月中旬  
・アクセル(フ) 1000倍(前日/2回)  
・コルト(顆) 400倍(前日/3回)  
・ナレート(水) 1000倍(14日/2回)

## 新ショウガ



3月下旬にショウガの定植を行う方は、圃場の準備作業が始まります。新ショウガを定植する30〜40日くらい前には、完熟堆肥を施用し、深耕整地を

### ケイ酸・鉄・リン酸の必要性

ケイ酸は、根や葉を丈夫にするので倒伏や病害(いもち病、ごま葉枯病等)を軽減します。また受光体制の改善により登熟歩合が向上します。

鉄は水稲の根を守る働きがあります。鉄分が不足すると根腐れによる「秋落ち」が生じる原因となります。

リン酸は、作物の根の発育を盛んにするので、ケイ酸が一層良く吸収されます。

### 土づくり資材

・農カアップ(100kg/10a)

\*秋落ち田では140kg/10a

鉄・ケイ酸・リン酸をバランスよく含む、土づくりに適した省力資材です。水稲の栽培に必要な成分を効率的に吸収できるように設計されています。特に、ケイ酸の溶出に優れ、吸収効率が大幅にアップしています。

### 行ってください。

・新ふりかけ堆肥eco(300kg/10a) または

・ハイフィンハイブリッドG(300kg/10a)

### 定植

植え付けの3日前頃に十分灌水し、土壌を湿らせておきましょう。種イモは変色や腐りのないものを使用してください。

## シシトウ



### わき芽摘み

圃場に定植し活着した後にいきます。摘み取り作業は、わき芽が長く伸びないうちに早く行うことが大切です。摘み取りが遅れると傷口が大きくなりやすく、また、天候の悪い日に摘み取ると傷口から病原菌が侵入する原因となるので注意しましょう。

### 夜温管理

果実の肥大には昼温より夜温の影響が強く、夜温を20℃以上で管理することが大切です。夜温が高すぎると落蕾、落花数が多くなりやすいですが、良い花の数が多いと減少しても花数が多いので、夜温を高め管理して開花数を増やし、良い果実を短期間に肥大させて収穫するほうがよいでしょう。

### 出荷の注意点

①花落ち付着に気をつけてください。  
②果実はヘタの切り口が新しいものを選び、収穫後は速やかに出荷してください。

## キャベツ



### 追肥

※石井中早生・YR春空

・ニューパワーユーキ262(100kg/10a)

または

・アツマップ545(80kg/10a)

握りこぶし程度の大きさに結球した時に施用してください。

### 病害虫防除

▽3月下旬

※春のかほりSP③

・アクセル(フ) 1000倍(前日/3回)

・パリダシン(液)5 800倍(7日/5回)

※石井・YR春空

・グレーシア(乳) 200倍(7日/3回)

・ウララDF 200倍(前日/2回)

・シグナムWDG 1500倍(7日/2回)

※SE

・フェニックス(顆) 200倍(前日/3回)

### 菌核病

菌核病の発生が多い傾向にあるので、

### 防除の徹底を!!

③選果・選別基準を守ってください。(変形・色・大小・入数等)

④病害虫果の混入、特に灰色カビ病、ヤケ果には注意してください。特に注意する点は適期収穫の徹底で、シシトウの長さが5〜6cmのものを収穫するようにつけつけてください。パック詰め作業では、各段階とも長さや形状が正常であっても、特に太いものや色のうすいもの、花やゴミ等が入らないように注意し、天候が悪い時に収穫したシシトウは風乾を行い、ムレのないように注意してください。(特に灰色カビ病の発生圃場では、パック内で病気が蔓延する恐れがあります。)

### 無加温栽培

定植時にアドマイヤー1粒剤(1〜2g/株)を植穴又は株元へ土壌混和してください。アブラムシ類、ミナミキイロアザミウマの防除に必要です。

## 青ネギ



### 播種・定植

ビニールトンネル等で被覆すると生育が良くなります。

### 病害虫防除

さび病とへと病はどちらも低温・多湿の条件を好むので、長い降雨の前には防除が必要です。また、夜間にもや・霧が発生すると同じく多発の原因となります。降雨前には予防効果、降雨後は治療効果を持つ薬剤を使用してください。また、乾燥条件ではアザミウマの発生

## ハクサイ



### 定植

※春さかり・黄葉70(パオパオがけ)

▽3月15日まで

### 元肥

・苦土セルカフミン(160kg/10a)

### 元肥・追肥型

・ニューパワーユーキ038プラス(120kg/10a)

または

・あさひS 602(120kg/10a)

## ニンジン



### 裂根対策

ニンジンでは本葉4〜7枚の頃から芯部の細胞増加と肥大が始まります。

この時期は次の急激な生長の始まる基礎づくりの時期で、もし肥料不足や乾燥、低温等によって生育が抑えられ、細胞の増加がにぶり、致命傷となります。裂根はこの時期の障害が原因で起こるもので、毎年裂根が多く発生する畑では「土づくり」に力を入れ、発芽を揃え、乾燥や肥料不足にならないように注意することが大切です。

### 圃場の準備

元肥を全層に施用し、15cm以上深く耕起しましょう。

### 播種

2条に浅く播種し、防寒被覆資材を全面に被覆後、十分に灌水しましょう。低温期で発芽に日数を要するため、土壌が乾燥しないように適宜灌水を行いましょう。



# ウメ

今年の開花は平年よりやや早い状況で交配面が心配されますが、適期防除を基本に、良品生産に努めましょう。

## ●晩霜対策

受精した花は、2〜3週間後から低温抵抗性が低下します。幼果は霜害により萎縮・落下します。低地や谷間の冷気が停滞しやすい圃地は、風通しを良くするため防風垣下部の刈り込みや防霜ファンを使用し予防しましょう。

## ●病害虫防除

防除は、降雨前に行うのが基本です。殺菌剤は、菌に感染する前に果実(葉・枝)を防除しないと効果がありません。かいよう病・灰色カビ病・黒星病は、雨が感染源で広まります。感染後の防除は手遅れです。降雨前の予防散布に努めましょう。

### ▽3月上旬・中旬

●かいよう病(ガク落ちまで)  
・Zボルドー 50倍(葉芽発芽前まで)  
または

・ICボルドー66D 50倍(葉芽発芽前まで)  
●灰色カビ病  
・ベルコート(水) 200倍(30日/3回)  
\*葉害発生の際のある場合(高温時)はクレフノン200倍を加用してください。

▽3月下旬  
●かいよう病  
※小梅等  
・マイコシールド 100倍(21日/4回)

※南高  
・カスミン(液) 50倍(60日/2回)  
●黒星病  
・デラン(フ) 200倍(14日/2回)  
◎アブラムシ類  
・スタークル(顆) 200倍(前日/3回)

# モモ

3月には開花が始まります。大玉果生産には欠かせない摘蕾作業が中心になります。

## ●摘蕾時期

3月上旬から開花前にかけて行います。蕾がふくらみ始め、赤みを帯びてきた頃が最も蕾が落ちやすく、効率的に作業ができる適期です。時期が早すぎると蕾が固く落とすにくく、開花直前になると葉芽を傷つけやすいため注意が必要です。本格的な摘果は5月からですが、樹勢の弱い樹は4月から行ってください。また、同時に枯れ枝を除去しましょう。

## ●病害虫防除

▽3月上旬  
●黒星病・縮葉病  
・トレノックスフロアブル 50倍(7日/5回)  
▽3月下旬(開花直前まで)  
◎せん孔細菌病  
・ICボルドー66D 50倍(随時)  
\*石灰硫黄合剤とは10日間あけてください。

# カキ

気温の上昇とともに、3月下旬頃から発芽期を迎え、本格的な生育が始まります。この時期は晩霜にあう危険性が高く、霜害で芽が枯れることがあります。特に、晴天で風のない日は霜が降りやすいので、気象情報には十分注意してください。

## ●晩霜対策

一般的に、低気圧の後に高気圧が張り出し、風が止んで夕方から夜空が澄み渡った日の翌朝の「底冷え」を感じる時、凍霜害が起こりやすくなります。対策としては、スプリンクラーで水を流し凍結を防ぐ散水法、風を送ることで空気を循環させ、霜が降りるのを防ぐ送風法があります。

## ●病害虫防除

▽3月下旬(萌芽直前)  
◎カイガラムシ類  
・石灰硫黄合剤 10倍(発芽前まで)  
・ネオエステリン 500倍加用  
◎うどんこ病  
・ホーマイコート 100倍(休眠期/1回)

## ●除草

春草があると、地温の上昇・水分の吸収を妨げ、春肥の吸収が悪くなります。早期に除草しましょう。

# ミカン

●病害虫防除  
12月〜1月にハーベストオイルを散布できていない圃地では、剪定後の3月中・下旬までに、カイガラムシやハダニ類防除としてハーベストオイル80倍を散布してください。ハーベストオイルは、虫を油膜で覆い、窒息死させる働きをするため、農薬の抵抗力をつけることなく高い防除効果が期待できます。樹冠の内部や葉裏まで丁寧に散布しましょう。

## ●除草

気温が上昇してくると春草の生育が旺盛になります。春肥を効率的に樹に吸収させるためには、施肥前の除草が必要です。土壌表面を裸地にすると地温の上昇にもつながり、春肥の肥効を高めることにもなります。プリグロックスL 150倍

## ●春肥

春肥の施用は、発芽した春芽の伸長や充実、開花結実、発根に大きく影響する大切な作業です。  
▽3月上旬  
・ニューわかやま味一ブリエット(80kg/10a)  
または  
・わかやま配合(80kg/10a)

# 野焼きは法律で原則禁止です

**野焼きとは**  
適法な焼却施設以外(ドラム缶などで廃棄物(ゴミ)を燃やすこと)を言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止されています。

**野焼き禁止の例外**  
農業、林業または水産業を営むためにやむを得ないものとして行われている廃棄物の焼却。具体的には刈草、剪定枝、もみ殻など、農業を営む上で、やむを得ず発生するものの焼却は例外(家庭ゴミと一緒に焼却するのは違反行為)とされています。

例外であっても、よく乾燥させてから少量ずつ焼却するなど、近隣の皆さまの迷惑とならないよう、お願いします。

**JAFファーム**  
令和3年産  
水稲作業委託受付中!  
※詳細は14ページをご確認ください。  
●申込締切日  
**3月12日(金)**

# 農薬使用の基本を守りましょう

## 農薬散布作業は適切に

- ◆ 農薬登録のある農薬を選び、使用目的にあった農薬を使う
- ◆ 使用量・希釈倍数は記載の範囲内で調整し、散布方法を守る
- ◆ 使用時期、収穫前日数、使用回数は必ず守る
- ◆ 農薬飛散防止のための基本的な施用法を実践する
- ◆ 散布が終わったら、散布器具、タンクなどを十分に洗う



# 果樹経営支援対策事業を活用しましょう!

- 果樹類の優良品目、品種など産地振興品目、品種への転換に対する助成です。
- ① 転換元がかんきつ類: **23万円/10a** ② 転換元が落葉果樹: **17万円/10a**
  - ③ 転換先が指定落葉果樹以外: **税抜き事業費の1/2以内** (3社見積もりが必要です。)  
※指定落葉果樹とは…桃、柿、梅、イチジク、ブドウ、栗を指します。
- 園内道などの整備に対する助成です。
- 補助率: **税抜き事業費の1/2以内** (3社見積もりが必要です。)
- 多目的スプリンクラーやマルチドリップなどの設置に対する助成です。
- 補助率: **税抜き事業費の1/2以内** (3社見積もりが必要です。)
- 代替軌道施設、防霜・防風施設(受電設備は含まない)の設置に対する助成です。
- 補助率: **税抜き事業費の1/2以内** (3社見積もりが必要です。)  
※モノラック(本機と荷台のセット)の更新(安全鑑定取得機種で既存設備より牽引能力、積載能力の向上が条件)とそれに伴うレールの延長、支線の整備、レールの更新ができます。
- 優良品目、品種へ転換した担い手に対して未収益期間(5年間)のうち、改植初年度を除いた4年間の果樹の育成経費の一部を定額で支援するものです。
- 補助単価: **22万円/10a** (5.5万円×4年)  
※事業終了後、果樹経営支援対策事業の補助金と一括で支払われます。

**事業対象者** 以下のすべての条件を満たす必要があります。

- 以下のいずれかに該当すること。  
①認定農業者 ②農業所得が主で60歳代までの者がいる農家 ③農業所得が主で後継者が確実にいる農家 ④農業生産法人 ⑤新規参入者
- 温州みかんに関する事業を実施する場合は、温州みかん需給調整対策事業に参加していること。
- 防霜、防風施設を希望される場合は以下の条件をすべて満たすこと。  
①果樹共済に加入していること ②受益面積は10a以上5ha未満であること ③国の補助事業による整備が困難であること

詳細は、最寄りの支店・営農センターまでお問い合わせください。  
事業のお申し込み締め切り日 **令和3年3月19日(金)**

# JAファーム 農作業受託料金表

品目	作業名	標準料金(10a当り) ※税込	内 容	備 考
水 稻	耕起(1回)	13,000		機械搬送料別途。
	施肥	5,000	元肥及び土壌改良剤の散布(機械散布)。	肥料は委託者が準備。 機械搬送料別途。
	代かき	13,000	手作業は行いません。	機械搬送料別途。
	田植え	10,000	4隅植え、補植は行いません。	苗は委託者が準備。 機械搬送料別途。
	施肥(元肥)	3,000	田植えと同時に散布します (側条施肥機対応肥料のみ)。	肥料は委託者が準備。
	箱剤散布	1,000	田植えと同時に散布します。	農薬は委託者が準備。
	除草剤散布	1,000	田植えと同時に散布します (田植同時処理剤のみ)。	除草剤は委託者が準備。
	刈り取り	30,000	・乾燥、籾摺りは受託者が行ってください。 ・隅刈りは委託者が事前に行ってください。 ・稲わらはカットします。	隅刈り・稲ワラ結束は別料金。 機械搬送料別途。
	隅刈り	4,000	・10a当り4隈の基本料金(追加は1隈ごとに +1,000円)。 ・委託者がどうしてもできない場合のみ、引き受け可。	刈り取りとセットの場合のみ。
	稲ワラ結束	2,000	5aで1,000円、稲ワラは圃場放置。	
	乾燥、籾摺り	25,000	乾燥、籾摺りのみの受託は行いません。	
	袋代	古米袋代(実費)	・古米袋代(小米も含む)は受託者が準備します。 ・出荷袋は、委託者が準備してください。	
	畦ざわ草刈 (見積対応)	草の背丈1.5m以上は作業不可です。		
草丈1.0m 以下	10,000	刈り倒しのみ。	機械搬送料別途。	
草丈1.5m 以下	12,000	刈り倒しのみ。		
水田、畑地 (見積対応)	全面草刈	草の背丈1.5m以上は作業不可(刈り株の高さは高いです)。		
	草丈0.5m 以下	20,000	刈り倒しのみ。	機械搬送料別途。
	草丈1.0m 以下	22,000	刈り倒しのみ。	
	草丈1.5m 以下	25,000	刈り倒しのみ。	
	全面草刈 (草刈機+モア作業)	35,000	草刈後、すぐに耕起できます。	
機械搬送料	2,000	トラクター、コンバイン、草刈り機等の運搬 1回(往復)。		

令和2年4月1日から適用

## ●注意事項

- ※除草剤散布、病害虫防除、穂肥(追肥)の作業は受託できません。
- ※作業時期が重なる場合は受託できないことがあります。
- ※作業機(トラクター、コンバイン等)が出入りできる、幅2m以上の道が必要です。  
畔越し田及び昇降路がない50cm以上の高さがある圃場は受託できません。
- ※原則として、上記料金は組合員の農地を対象とします。  
なお、特別な理由がある場合は組合員以外の農地も対象とし、作業受託料金および受託条件は個別に設定します。
- ※水稲は、中干しの徹底と、収穫時コンバインが入れる様に水管理をしてください。  
管理されていない場合、無理な刈り取りをしないため後に回します。
- ※作業終了後、作業車の昇降した道路の土の除去は、委託者が行ってください。
- ※作業受託下限面積 1ヶ所につき 5aです。
- ※水稲受託作業以外は委託者の日程での作業は行いません。

### 《委託者遵守事項》

**\*委託者はビニール・空き缶、ビン類等のゴミを、作業前までにあらかじめ圃場から撤去してください。**

(受託作業を行わない場合)

- ①作業車を運搬する3トン車輛が通行できない場合、及び作業車を下車させてから作業圃場までの距離が長い場合。
- ②3トン運搬車の駐車スペースがない場合(委託者が準備してください)。
- ③委託者遵守事項を繰り返し守らない場合。

**お申し込みは お近くの支店または営農センターまで**



双子座  
5/21~6/21

全体運  
健康運

●気持ちが引き締まりポジティブシンキングに。開拓したいことがあればチャレンジのとき。ただ暴走には注意が必要。  
●体を鍛える好機。ハードなトレーニングも◎

幸運を呼ぶ食べ物 ●ナバナ